

Số: /HD-TTĐVNN

Thanh Hà, ngày tháng năm 2022

HƯỚNG DẪN
Các biện pháp tỉa cành, tạo tán,
chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây vải sau thu hoạch

Để chủ động chuẩn bị cho vụ vải năm 2022 - 2023, Trung tâm DVNN hướng dẫn các biện pháp tỉa cành, tạo tán, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây vải sau thu hoạch:

1. Đốn tỉa, vệ sinh vườn vải:

- Thời gian đốn tỉa: Sau thu hoạch.

- Kỹ thuật đốn tỉa:

+ Với những cây đã thường xuyên được đốn tỉa: Dùng dao phát toàn bộ mặt tán, vị trí phát cách vết đốn năm trước 8 - 10cm. Sau đó tỉa bỏ những cành mọc xiên, cành tăm, cành khuất, cành đập gãy, cành vượt, cành sâu bệnh và một số cành nhỏ ở bề mặt tán để loại bỏ những cành vô ích đặc biệt giúp cây sớm phục hồi sau thu hoạch, đảm bảo cây vải có bộ tán thông thoáng hạn chế sâu bệnh hại.

+ Với những cây không đốn tỉa hàng năm và cây đã khép tán: đốn sâu vào bề mặt tán ở vị trí cành có đường kính 1 - 2cm, tạo tán hình mâm xôi để định hình cành mẹ và giảm độ cao của tán, sau đó tỉa bỏ cành mọc xiên, cành sâu bệnh, một số cành vượt ở giữa tán để tán cây thông thoáng ra cành lộc mới thuận lợi.

Cần tiến hành cắt tỉa cành, tạo tán đối với tất cả diện tích vải, kể cả diện tích vải năm trước không ra quả, để đảm bảo cho cây vải sinh trưởng phát triển đồng đều.

Sau khi đốn tỉa cành tạo tán phải vệ sinh vườn, làm cỏ và thu gom cỏ cành khô, cành sâu bệnh, rác, quả rụng mang đi tiêu hủy để giảm nguồn sâu bệnh lây lan sang vụ sau.

Lưu ý: Khi thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao các hộ nông dân tạm ngừng cắt, tỉa cành. Đối với những cây đã tiến hành đốn tỉa sâu nên sử dụng quần áo cũ cuốn hoặc che phủ các đầu cành cắt để hạn chế mất nước và khô đầu cành. Sử dụng thân lá, cành vải sau cắt tỉa để ủ gốc giữ ẩm cho cây.

2. Chăm bón:

- Mục đích: Cung cấp dinh dưỡng giúp cây phục hồi, ra lộc mạnh, đúng thời điểm, hạn chế ra quả cách năm, đảm bảo cho cây ra từ 2 - 3 đợt lộc (lộc hè và lộc thu). Đảm bảo cho cây chuyển sang giai đoạn phân hóa mầm hoa thuận lợi.

- Thời gian bón: Bón thúc lộc 2 - 3 lần/năm, lần 1 sau khi đốn tỉa và lần cuối trước 10/10/2022.

Lưu ý: Đối với vùng trũng, vùng tiêu úng chậm, nếu cắt tỉa cành muộn, và chưa bón thúc lộc trước 15/7 thì chỉ bón thúc lộc 1 - 2 lần/ năm; lần 1 cuối tháng 8 để tránh những đợt ngập úng có thể xảy ra vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 gây chết cây.

- Liều lượng bón:

Đường kính tán (m)	Đạm urê (kg)	Supe lân (kg)	Kali sunphat (kg)	Phân chuồng (kg)
1,0 – 1,5	0,1 - 0,15	0,3 - 0,35	0,05 - 0,1	10 - 15
2,0 – 2,5	0,15 - 0,2	0,35 - 0,4	0,1 - 0,15	10 - 20
3,0 – 3,5	0,2 - 0,25	0,4 - 0,5	0,15 - 0,2	10 - 20
4,0 – 4,5	0,25 - 0,3	0,5 - 0,6	0,2 - 0,25	40 - 50
5,0 – 5,5	0,3 - 0,35	0,7 - 0,8	0,25 - 0,3	40 - 50
6,0 – 6,5	0,35 - 0,4	0,8 - 0,9	0,3 - 0,35	40 - 50
> 6,5	0,5	1,0	0,4	50

(Nếu vải trồng trên đất xấu, cây yếu thì dùng phân bón lá bổ sung).

Nếu sử dụng phân đa lượng thì các hộ nông dân ưu tiên sử dụng các loại phân bón có hàm lượng đạm và lân cao.

- Cách bón:

Bón phân chuồng: đào rãnh xung quanh cây theo hình chiếu của tán với bề mặt rãnh rộng 20 - 30 cm, sâu 30 cm, rải phân, lấp đất và tưới nước giữ ẩm. Hoặc có thể đào 3 rãnh theo hình vành khăn xung quanh tán để bón, năm sau bón tiếp phần còn lại.

Bón phân vô cơ: khi đất ẩm chỉ cần rải phân lên mặt đất theo hình chiếu của tán, sau đó tưới nước để hoà tan phân. Khi trời khô hạn cần hoà tan phân trong nước để tưới hoặc rải phân theo hình chiếu của tán, xới nhẹ đất và tưới.

3. Phòng trừ sâu bệnh:

- Đối với những vườn vải nhiễm rệp vảy sau khi tỉa cành tạo tán các hộ nông dân chú ý thu gom những cành lá cắt tỉa đem tiêu hủy bằng cách đốt hoặc đào hố chôn vùi (đào hố, cho cành, lá bị hại xuống hố sau đó nên rắc một lớp vôi bột lên bề mặt trước khi lấp đất).

Sau đó dùng thuốc Glim 270SC hoặc Javipas450EC, Selecron 500EC phun trừ để hạn chế nguồn rệp lây lan sang vụ sau.

- Giai đoạn sau thu hoạch khi cây bắt đầu ra lộc non cần chú ý phun trừ các loại dịch hại như sau:

Đối với sâu cuốn lá, sâu đo, sâu cuốn tổ: dùng Repdor 250EC hoặc Peran 50EC, ... kết hợp với 1 loại thuốc sinh học phun trừ khi thấy sâu xuất hiện từ 1,5 con/cành trở lên.

Đối với bệnh sùi cành: Dùng dao cùn cạo sạch các vết bệnh (không cạo sâu vào phần vỏ cây) sau đó dùng dung dịch Boocđô 2% phun toàn bộ thân cành hoặc quét vào gốc từ mặt đất lên 1,5m.

Nơi nhận:

- VP UBND huyện;
- Đ/c lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo UBND các xã; TT
- Các phòng ban liên quan;
- Lưu.

} Để báo cáo

**TRUNG TÂM DVNN HUYỆN
GIÁM ĐỐC**

Phạm Văn Cường

