

Số: 06 /TB-TTĐVNN

Thanh Hà, ngày 18 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh trên lúa chiêm xuân, cây ăn quả và dự báo trong thời gian tới

Kính gửi: 20 xã, thị trấn trong toàn huyện

I. THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG

1. Thời tiết: Trong thời gian qua trời nắng liên tục cuối kỳ có đợt không khí lạnh gây mưa rào. Nhiệt độ trung bình 22 - 28°C, ẩm độ không khí trung bình 75 - 85%.

2. Cây trồng:

- Lúa xuân: Các trà lúa cuối đẻ nhánh đến đứng cái, làm đòng.
- Trên cây vải: Trà vải sớm, vải nhỡ đang làm cùi. Trà vải thiều đậu quả đến quả non.

II. DIỄN BIẾN SÂU BỆNH

1. Trên lúa xuân:

- Chuột: Gây hại rải rác các trà lúa. Tỷ lệ danh bị hại trung bình 1,0%, nơi cao 1,8%.
 - Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành rải rác vũ hóa từ 12/4, vũ hóa rộ từ 16/4 trở đi mật độ trưởng thành trung bình 0,08con/m², nơi cao 0,3con/m².
 - Bệnh khô vằn: Phát sinh gây hại trà lúa xuân sớm. Tỷ lệ danh bị nhiễm trung bình 0,8%, nơi cao 2,0% cấp bệnh từ cấp 1 đến cấp 3.
 - Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Lây lan gây hại các giống nhiễm như TBR225, BT7, DQ11 ... tỉ lệ lá bị nhiễm trung bình 3,5%, nơi cao 15,7%, cấp bệnh cấp 1 đến cấp 3.
- Diện tích nhiễm trong toàn huyện khoảng 35ha như ở các xã Thanh Hải, Thị Trấn Thanh Hà, Việt Hồng, Hồng Lạc, ...
- Bệnh đạo ôn: Gây hại một số giống nhiễm như: TBR225, nếp, ... Tỷ lệ lá bị nhiễm trung bình 2,5%, nơi cao 4,5%.

Ngoài ra còn sâu đục thân, bệnh vàng lá, cháy lá sinh lý do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, ...

2. Trên cây vải:

- Sâu đục hạt: Gây hại quả trà vải sớm, vải nhỡ. Tỷ lệ quả bị hại trung bình 0,5%, nơi cao 2,1%, sâu tuổi 3 đến trưởng thành.
- Bọ xít: Bọ xít non gây hại quả các trà vải. Mật độ trung bình 0,2 con/cành, nơi cao 0,5con/cành.
- Sâu đo: Gây hại quả non trà vải thiều. Mật độ trung bình 0,1 con/cành, nơi cao 0,5con/cành, đa số tuổi 1 đến tuổi 4. Diện tích nhiễm 100ha.

Ngoài ra còn rệp sáp, rệp muội, bệnh sương mai, rụng quả sinh lý, ...

III. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Trên lúa xuân:

- **Chuột:** Tiếp tục gây hại các trà lúa.
- Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành tiếp tục vũ hóa rộ, sâu non nở gây hại lá các trà lúa từ ngày 21/4 trở đi.
- Bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn: tiếp tục lây lan gây hại các giống nhiễm khi thời tiết có mưa rào và giông.
- Bệnh đạo ôn: Nếu thời tiết âm u, mưa ẩm bệnh lây lan gây hại lá, lá đòng các giống nhiễm như nếp, TBR225, ...
- Bệnh khô vằn: tiếp tục lây lan gây hại các trà lúa.

Ngoài ra còn sâu đục thân, bệnh vàng lá, cháy lá sinh lý...

2. Trên cây vải:

- Sâu đục hạt: Trưởng thành tiếp tục vũ hóa, đẻ trứng trên các trà vải. Sâu non nở gây hại quả trà vải sớm, vải nhỡ từ 19/4 trở đi.
 - Sâu đo: Gây hại quả trà vải thiêu.
 - Bọ xít: bọ xít non di chuyển gây hại quả các trà vải.
 - Bệnh thán thư: Nếu thời tiết nắng nóng có mưa ẩm bệnh phát sinh, lây lan gây hại quả các trà vải.
 - Bệnh sương mai: Nếu thời tiết có mưa ẩm bệnh phát sinh gây hại quả các trà vải.
- Ngoài ra còn rụng quả sinh lý, rệp sáp, rệp muội, ...

IV. ĐỀ NGHỊ

Các xã tổ chức và chỉ đạo tốt chiến dịch diệt chuột theo Kế hoạch số 943/KH - UBND ngày 26/11/2021 của UBND huyện Thanh Hà.

1. Trên cây lúa:

- Các xã điều tiết nước phù hợp để các trà lúa làm đồng được thuận lợi.
- Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Dùng thuốc Takumi 20WG, Prevathon 5SC, Virtako 40WG, Voliam Tago 63SC..., Phun cho diện tích lúa xuân sớm xanh tốt từ ngày 21/4 đến ngày 25/4.
- Đối với bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn: Dùng một trong các loại thuốc phun phòng như: Starner 20WP, Starwiner 20WP, Sasa 20WWP, Ychatot 900SP ... phun để hạn chế bệnh phát sinh, lây lan.
- Đối với bệnh khô vằn: Dùng Tilt super 300ND hoặc Nevo 330EC, Tiptop 250EC, Anvil 5SC, ... phun phòng trừ khi bệnh chớm xuất hiện.
- Đối với bệnh đạo ôn: Dùng một trong các loại thuốc sau: Filia 525SE, Fuji-one 40WP, Katana 20SC, Bankan 600WP,...phun phòng trừ khi bệnh chớm xuất hiện.

2. Trên cây vải:

- Đối với sâu đục hạt: Dùng thuốc Virtako 40WG, Prevathon 5SC, Prevathon 35WG, Voliam Tago 63SC phun cho trà vải sớm, vải nhỡ từ ngày 19/4 đến 22/4 và phải phun kép 2 lần (lần 2 cách lần 1 từ 6 đến 7 ngày).
- Đối với bệnh sương mai: Dùng Ridomin 68WG, Ricide 72WP, Antracol 70WP, Dosay45WP... phun cho các trà vải.
- Đối với bệnh thán thư: Dùng Amistar 250SC, Haohao 600WP hoặc Anvil 5SC, Manage 5WP ... phun phòng trừ khi thấy bệnh chớm xuất hiện.
- Đối với sâu đo: Dùng Dylan 2EC, Pounce 50EC, Peran 50EC, Kinalux 25EC, ... phun trừ khi phát hiện mật độ sâu đo 0,25con/cành,
- Đối với bọ xít, rệp muội: Dùng Karate 2.5EC, Cyperkill 10EC, Altach 5EC, ... phun trừ khi thấy mật độ bọ xít 1con/cành, rệp muội 5% số cành.

(Không hỗn hợp quá nhiều loại thuốc để phun và luân phiên sử dụng thuốc trong quá trình sử dụng để hạn chế tính kháng thuốc của sâu)

Nơi nhận:

- VP: Huyện uỷ, VP HĐND- UBND huyện;
- Đ/c Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Chi cục TT&BVTV, KN tỉnh
- Như kính gửi;
- Các phòng ban liên quan;
- Các hộ kinh doanh thuốc BVTV
- Lưu.

**TRUNG TÂM DVNN
GIÁM ĐỐC**

Phạm Văn Cường

