

Số: /TB-TTĐVNN

Thanh Hà, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh cây ăn quả và dự báo trong thời gian tới

Kính gửi: 20 xã, thị trấn trong toàn huyện

I. THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG

1. Thời tiết: Trong thời gian qua trời nắng mưa xen kẽ. Nhiệt độ trung bình 26 - 32⁰C (cá biệt có những ngày (05,06/5) nắng nóng gay gắt nhiệt độ lên đến 40⁰C), ẩm độ không khí trung bình 80 - 90%.

2. Cây trồng

Trà vải sớm (u trứng trắng, u trứng gai) đang chín;

Trà vải nhỡ chuẩn bị báo mã;

Trà vải thiều đang làm cùi đến gần đầy cùi.

II. DIỄN BIẾN SÂU BỆNH

- Sâu đục quả, sâu đục cuống: Gây hại cục bộ quả trà vải sớm, vải nhỡ. Tỷ lệ quả bị hại trung bình 0,2%, nơi cao 0,7%, sâu tuổi 3 đến trưởng thành.

- Bệnh thán thư: Gây hại quả các trà vải sớm, vải nhỡ. Tỷ lệ quả bị nhiễm trung bình 5 %, nơi cao 10 %, cấp bệnh từ cấp 1 đến cấp 5.

Ngoài ra còn rệp sáp, bệnh sương mai, bệnh chàm quả, ... gây hại rải rác.

III. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

- Sâu đục quả, sâu đục cuống: Trưởng thành tiếp tục vũ hóa, đẻ trứng, sâu non nở gây hại quả trà vải nhỡ, vải thiều.

- Bệnh thán thư: Nếu thời tiết nắng nóng có mưa ẩm bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan gây hại quả các trà vải.

Ngoài ra còn rệp sáp, bọ xít, bệnh sương mai,

IV. ĐỀ NGHỊ

- Trên trà vải nhỡ.

Sâu đục cuống quả: Dùng thuốc Prevathon 5SC hoặc thuốc có 1 hoạt chất *Chlorantraniliprole* kết hợp với thuốc có 1 hoạt chất Ebamectinbenzoat như Dylan, COMPATT55.5WDG ...phun từ ngày 14/5/2023 đến 18/5/2023 khi quả vải báo mã. (Riêng vùng vải xuất khẩu đi Nhật Bản chỉ dùng thuốc sinh học có 1 hoạt chất Ebamectinbenzoat phun trừ).

- Trên trà vải thiều:

Sâu đục cuống quả: Dùng thuốc Prevathon 5SC, Prevathon35WG hoặc thuốc có 1 hoạt chất *Chlorantraniliprole* kết hợp với thuốc có 1 hoạt chất Ebamectinbenzoat như Dylan, COMPATT55.5WDG ... phun khi quả vải từ ngày 14/5 đến 18/5 khi quả vải gần đầy cùi.

- Đối với bệnh thán thư, bệnh sương mai: Dùng Amistar 250SC, hoặc những thuốc có 1 hoạt chất *Azoxystrobin* ... phun khi bệnh chớm xuất hiện.

Chú ý: Phun vào chiều mát tránh gây cháy mã quả. Ngừng phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày đảm bảo thời gian cách ly và luân phiên sử dụng thuốc trong quá trình sử dụng để hạn chế tính kháng thuốc của sâu.

Nơi nhận:

- VP: Huyện uỷ, VP HĐND- UBND huyện;
- Đ/c Chủ tịch , PCT UBND huyện;
- Chi cục TT&BVTV
- Như kính gửi;
- Các phòng ban liên quan;
- Các hộ kinh doanh thuốc BVTV
- Lưu.

**TRUNG TÂM DVNN
GIÁM ĐỐC**

Phạm Văn Cường