

Hướng dẫn
xử lý rệp sáp vảy trên vải giai đoạn cuối vụ

Hiện nay, cục bộ trên một số vườn vải, nhất là vườn trồng giống vải u hồng, u thâm và bắt đầu xuất hiện trên trà vải tàu lai, vải thiều ở các xã như Thanh Quang, Thanh Hồng, Thanh Thủy, Thanh Xá, Thanh Khê, ... loài rệp vảy. Để phòng trừ loại dịch hại này có hiệu quả, Trung tâm DVNN hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ như sau:

I. Đặc điểm gây hại:

Rệp vảy phát triển rất nhanh và có thể tồn tại trên cây trồng một thời gian dài, chúng có kích thước nhỏ 2 – 3mm, toàn thân được bao bọc một lớp vảy cứng, chúng thường bám cố định rất chặt trên bề mặt, kẽ quả vải, chích hút dịch quả làm cho vỏ quả vải bị thâm đen, gây thối quả.

II. Điều kiện phát sinh phát triển:

Loài rệp này thường gây hại trong các tháng đầu mùa mưa đặc biệt là thời gian có các giai đoạn nắng mưa xen kẽ nhau.

III. Biện pháp phòng trừ:

Các hộ nông dân tăng cường kiểm tra, rà soát các vườn vải để đánh giá về thời điểm thu hoạch và mức độ gây hại của rệp vảy để có cách xử lý theo từng trà như sau:

1. Đối với vườn vải đang cho thu hoạch hoặc sắp cho thu hoạch:

- Khẩn trương thu hoạch vải đã chín.
- Ngắt bỏ, thu gom những cành lá, chùm quả bị rệp hại nặng đem tiêu hủy để hạn chế rệp lây lan. Nên tiêu hủy bằng cách đào hố chôn vùi (đào hố, cho cành, lá, quả bị rệp hại xuống hố sau đó nên rắc một lớp vôi bột lên bề mặt trước khi lấp đất).

- Sau khi thu hoạch xong, khẩn trương cắt tỉa tạo tán cho cây, thu gom cành lá đem đốt để hạn chế nguồn rệp và phun thuốc để trừ rệp cho những vườn trước đó đã bị rệp gây hại.

2. Đối với những vườn vải còn xanh:

- Kiểm tra và bẻ những chùm, cành nào bị rệp gây hại nặng đem tiêu hủy như cách trên.

- Dùng thuốc Movento150OD phun trừ rệp nếu còn đủ thời gian cách ly từ 20 ngày trở lên.

Nơi nhận:

- Đ/c Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Chi cục TT&BVTV, KN tỉnh
- Như kính gửi;
- Các phòng ban liên quan;
- Các hộ kinh doanh thuộc BVTV
- Lưu.

Để
báo
cáo

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Thị Thơm